

POURQUOI LA VACCINATION ?

La vaccination est l'un des plus grands succès en santé publique, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à cet acte simple de prévention.

La vaccination permet de se protéger contre différents virus et bactéries à l'origine des maladies infectieuses mais aussi de protéger son entourage, notamment les personnes trop jeunes ou fragiles pour se faire vacciner : nouveau-nés, femmes enceintes, personnes souffrant d'une affection contre-indiquant la vaccination, personnes âgées, etc.

Actuellement, les vaccinations contre la rougeole et les infections à méningocoque C restent insuffisantes, entraînant la survenue de cas graves liés à ces maladies qui auraient pu être évités par une meilleure couverture vaccinale.



JE ME VACCINE, JE NOUS PROTÈGE

CENTRE DE VACCINATION

10 rue Hancy

Fichier vaccinal ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 15h45

Séances de vaccination :

- Lundis de 8h30 à 10h
- Mercredis de 13h30 à 15h30
- Vendredis de 8h30 à 10h

Vaccination BCG :

sur rendez-vous uniquement

Tests tuberculiques :

Lundis, mardis, mercredis et vendredis

LE VILLAGE, MAISON DES SOLIDARITÉS ET DU PARTAGE

Avenue Émile Ripert, jardin Lecuyer

PÔLE SANTÉ DES MOULINS

19 avenue Martin Luther King

Pour tout renseignement : 04 92 17 44 90
service.vaccinations@ville-nice.fr et sur nice.fr

RDV le,

.....
.....

VACCINICE



**FAITES LE POINT
SUR LA VACCINATION
DE VOS ENFANTS
ET FAITES-LES VACCINER
GRATUITEMENT**

2022 CALENDRIER DES VACCINATIONS



		VACCINATIONS OBLIGATOIRES POUR LES NOURRISSONS													
Âge approprié		1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	45 ans	65 ans et +
VACCINATIONS OBLIGATOIRES	BCG														
	Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite													Tous les 10 ans	
	Coqueluche														
	Haemophilus Influenzae de type b (HIB)														
	Hépatite B														
	Pneumocoque														
	Méningocoque C														
	Rougeole-Oreillons-Rubéole														
	Méningocoque B														
	Papillomavirus humain (HPV)														
	Grippe														Tous les ans
	Zona														

• BCG (Tuberculose)

La vaccination contre la tuberculose est le plus souvent recommandée à partir de 1 mois et jusqu'à l'âge de 15 ans chez les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose.

• Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite

Les rappels de l'adulte sont recommandés à âges fixes soit 25, 45, 65 ans et ensuite tous les dix ans.

• Coqueluche

Le rappel coqueluche se fait à 25 ans. Les futurs parents sont particulièrement concernés car la vaccination protège les nourrissons de moins de 6 mois dont la vaccination n'est pas complète.

• Haemophilus Influenzae de type b (Hib)

Pour les enfants n'ayant pas été vaccinés avant 6 mois, un rattrapage vaccinal peut être effectué jusqu'à l'âge de 5 ans avec le vaccin monovalent (1 à 3 doses selon l'âge).

• Hépatite B

Si la vaccination n'a pas été effectuée au cours de la 1^{re} année de vie, elle peut être réalisée jusqu'à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d'hépatite B.

• Pneumocoque

Au-delà de 24 mois, cette vaccination est recommandée chez l'enfant et l'adulte à risque.

• Méningocoque C

À partir de l'âge de 12 mois et jusqu'à l'âge de 24 ans inclus, une dose unique est recommandée pour ceux qui ne sont pas déjà vaccinés. Les infections invasives à méningocoques se manifestent sous la forme de méningite ou de septicémie. Il s'agit d'une maladie qui touche essentiellement les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Elle peut être très grave : la fréquence des décès et des séquelles définitives (atteintes cérébrales, auditives ou amputation des membres) sont chacune d'au moins 10 %. Ne sous estimez pas l'importance de vous faire vacciner.

• Rougeole- Oreillons - Rubéole

Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses de vaccin.

La rougeole est une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Elle peut se compliquer en pneumonie et/ou encéphalite, menant parfois au décès.

La vaccination contre la rougeole consiste en l'administration de 2 doses de vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR), la première à l'âge de 12 mois, la seconde avant l'âge de 18 mois.

La protection à l'issue des deux doses est proche de 100%.

• Méningocoque B

Un rattrapage est possible jusqu'à l'âge de 2 ans pour les nourrissons n'ayant pas reçu les trois doses de vaccins recommandées à 3, 5 et 12 mois.

• Papillomavirus humain (HPV)

La vaccination est recommandée chez les filles et les garçons âgées de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 19 ans inclus. De plus, la vaccination est recommandée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à l'âge de 26 ans.

• Grippe

La vaccination est recommandée, chaque année, notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques dont les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et les personnes obèses (IMC>40 kg/m²).

• Zona

La vaccination est recommandée chez les personnes âgées de 65 à 74 ans inclus.

Qu'est-ce que ça veut dire « être à jour » ?

« Être à jour » c'est avoir reçu les vaccins nécessaires en fonction de son âge et avec le bon nombre d'injections pour être protégé.

Si mes vaccins ne sont pas « à jour » ?

Il n'est pas nécessaire de tout recommencer, il suffit de reprendre la vaccination au stade où elle a été interrompue. On parle de « rattrapage »